

核准日期：2024年12月01日
修改日期：2024年12月13日
2025年02月05日

阿昔莫司胶囊说明书


请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：阿昔莫司胶囊
英文名称：Acipimox Capsules
汉语拼音：Aximosi Jiaonang

【成份】

本品主要成份为阿昔莫司，其化学名称为：5- 甲基吡嗪 -2- 甲酸 -4- 氧化物。
化学结构式：



分子式：C₆H₆N₂O₃

分子量：154.13

辅料包括：预胶化淀粉、胶态二氧化硅、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁和明胶空心胶囊。

【性状】

本品内容物为白色至微黄色颗粒或粉末。

【适应症】

本品可作为替代疗法或辅助疗法用于降低对其他治疗（如他汀类药物或贝特类药物）不能充分缓解的患者的甘油三酯水平，适用于以下病症：

高甘油三酯血症（Fredrickson IV型高脂蛋白血症）

高胆固醇和高甘油三酯血症（Fredrickson IIb型高脂蛋白血症）

在采取饮食改变和其他非药物治疗（如运动、减肥）等其他措施之后方可使用本品。

目前尚未证实使用阿昔莫司治疗高脂蛋白血症可降低心血管病发病率和死亡率。

【规格】0.25g

【用法用量】

每日剂量可根据血浆甘油三酯和胆固醇水平而定。每日平均剂量为：每次 1 粒，每日 2-3 次，饭后服用。

IV 型高脂蛋白血症，每次 1 粒，每日 2 次。

IIb 型、III 型及 V 型高脂蛋白血症，每次 1 粒，每日 3 次。

对于特殊重症患者可根据医嘱增加剂量。

每日总量不超过 1200mg，可长期安全服用。

肾损害患者：应根据肌酐清除率水平而调整剂量。可按下述方案给药：肌酐清除率 80~40ml/min，每日一粒；40~30ml/min，隔日一粒。

【不良反应】

该药特别是在治疗初期可引起皮肤血管扩张现象（变红、潮热感和瘙痒）。

这些症状通常在治疗后最初几天内迅速消失。

在治疗期间偶有胃肠反应（胃灼热感，上腹痛）、头痛和乏力的报道。只有罕见病例因严重的不良反应而需终止治疗。极少数患者有局部和全身反应，有时很严重，可能与免疫变态反应有关（如，荨麻疹、眼睑和 / 或唇水肿、皮疹、哮喘样呼吸困难和低血压）。这些情况的患者应立即停用本品，并采取适当的治疗措施。

经阿昔莫司的临床及上市后经验发现并报道了下述不良反应，其发生率定义如下：非常常见 (≥1/10)；常见 (≥1/100 至 <1/10)；不 常见 (≥1/1,000 至 <1/100)；罕 见 (1/10,000 至 <1/1,000)；非常罕见 (< 1/10,000)；未知 (无法通过现有数据估计)。

按 MedDRA 系统器官分类	发生率	不良反应
免疫系统异常	不常见	过敏反应 *
神经系统异常	非常常见	头痛
心血管系统异常	非常常见	潮红
	未知	血管舒张 **
呼吸系统、胸廓与纵隔异常	不常见	支气管痉挛 *
胃肠道系统异常	非常常见	消化不良
	常见	上腹痛
	不常见	恶心 *
	未知	腹泻 **
皮肤及皮下组织异常	常见	荨麻疹
	不常见	血管性水肿 *, 瘙痒 *, 皮疹 *, 红斑 *
肌肉骨骼及结缔组织异常	不常见	肌炎 *, 肌痛 *, 关节痛 *
全身异常及给药部位各种反应	常见	乏力
	不常见	发热感 *, 不适 *

* 由上市后安全数据库评估的不良反应发生率

** 无法通过现有数据评估不良反应发生率

如果出现说明书中未提及的任何非预期的反应，患者应通知他的医生或药师。

【禁忌】

以下患者禁用本品：

-对本品活性成分及任何辅料过敏

-消化道溃疡

-严重肾损伤（肌酐清除率小于30ml/min）。

【注意事项】

在使用阿昔莫司治疗之前，应采用适当饮食控制血脂，同时需要戒酒，运动以及减轻体重，以免发生肥胖。建议患者长期接受阿昔莫司治疗，因此应在治疗前检测包括血脂谱在内的所有基线值，并定期检测血脂以确定是否达到预期疗效。应监测肝功能和肾功能。

虽然在动物实验中没有发现任何对胎儿的损害，但妊娠或可疑妊娠以及哺乳期的妇女禁止服用阿昔莫司（见【孕妇及哺乳期妇女用药】）。

阿昔莫司的结构与烟酸相关。同时服用烟酸与他汀类药物（即 3- 羟基 -3- 甲基戊二酰辅酶 A [HMG-CoA] 还原酶抑制剂），肌肉毒性的风险将增加。一项研究报道，服用烟酸加 laropiprant 的中国患者联合使用辛伐他汀后，其肌病和横纹肌溶解症的发生率相比白种人较高。

钠

本品每粒胶囊的钠含量低于 1 毫摩尔（23 毫克），相当于“无钠”。

对驾驶和操纵机器能力的影响

虽然目前尚没有相关研究，但从药效学及总体安全性信息来看，阿昔莫司不太可能会影响驾驶和操纵机器能力。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠期的安全性尚未被证实。阿昔莫司能否从人类乳汁中分泌尚未知。与大多数药物一样，孕妇及哺乳期妇女禁用。

【儿童用药】

尚无相关研究资料。

【老年用药】

尚无相关研究资料。

【药物相互作用】

在同时应用降糖药或抗凝药的患者中没有显示出不良的药物相互作用。

未见与其他降脂药的相互作用。但当阿昔莫司与他汀或贝特类药物联合应用时应谨慎，因为有烟酸(阿昔莫司结构类似物)与这类降脂药联合应用时骨骼肌肉事件增加的报道。

未见与地高辛和华法林的相互作用。

【药物过量】

在文献中没有药物过量病例的描述。

如果出现毒性反应，应进行维持疗法并对症治疗。

【临床药理】

药代动力学：

本品口服后可被完全迅速地吸收，血药浓度在2小时内达到峰值，半衰期约为2小时。本药不与血浆蛋白结合，不被代谢，从尿中排出。

【药理毒理】

药理作用：

阿昔莫司抑制游离脂肪酸从脂肪组织中的释放，降低血中极低密度(VLDL)和低密度 (LDL) 脂蛋白浓度，从而降低甘油三酯和总胆固醇水平。

此外，阿昔莫司可对高密度脂蛋白胆固醇产生有益作用，在用药期间可见升高。通常在用药的第一个月即可见到其对血脂的改善作用。

毒理研究：

阿昔莫司遗传毒性试验结果为阴性。阿昔莫司动物试验未见致畸性。阿昔莫司小鼠和大鼠致癌试验未见致癌性。

【贮藏】

密封，不超过30℃保存。

【包装】

聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔包装，10 粒 / 板，1 板 / 盒，2 板 / 盒，3 板 / 盒，4 板 / 盒，5 板 / 盒。

【有效期】18个月。

【执行标准】YBH18762024

【批准文号】国药准字H20249501

【上市许可持有人】

企业名称：浙江高路医药科技股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心 20 幢101室

邮政编码：310018

电话号码：0571-88885280

【生产企业】

企业名称：浙江赛默制药有限公司

生产地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街 788 号

邮政编码：321075

电话号码：0579-88970118

BS03602

尺寸：130mm×160mm